



برنامه ریزی مقید روش های جریمه ای و مانعی

محسن هوشمند

دانشکده تکنولوژی اطلاعات و علم رایانه
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

روش جریمه‌ای و مانعی

تقریب زدن مسئله بهینه‌سازی مقید با مسائل نامقید

▪ روشن جریمه‌ای

▪ افزودن جمله‌ای به تابع هدف

▪ جمله موجب ایجاد هزینه زیاد در صورت تخطی از قید

▪ روشن مانعی

▪ افزودن جمله‌ای به تابع هدف

▪ جمله موجب ارجح دانستن نقاط داخل منطقه شدنی به نقاط نزدیک مرز

هر دو دارای ضریبی c

▪ تعیین کننده شدت جریمه یا مانع

▪ با $c \rightarrow \infty$

▪ دقیق‌تر شدن تقریب

▪ وجود توابع خاص دارای جواب دقیق به ازای مقادیر متناهی

روش جریمه‌ای و مانعی

دو مسئله اساسی مرتبط با این روش‌ها

- اهمیت مناسب بودن تقریب مسئله نامقید از مسئله مقید

- همگرایی

- چگونگی حل مسئله نامقید تابع هدف شامل جمله جریمه یا مانع

روش جریمه‌ای و مانعی

دارای تابع هدف اصلی
به علاوه مقدار نامنفی اضافی جهت هر قیدی که رعایت نشود
تبدیل به صورت نامقید
جریمه بیشتر با تعددی بیشتر از قید
تحکیم بیشتر قیدها در هر مرحله جهت

- ماندن در منطقه شدنی
- همزمان میل به کمینه

روش جریمه‌ای

$$\min f(x)$$
$$x \in \Omega$$

تعویض مسئله مقید با تابع جریمه
دارای تابع هدف اصلی

$$\min f(x) + \mu P(x)$$

به علاوه مقدار نامنفی اضافی جهت هر قیدی که رعایت نشود
تبديل به صورت نامقید

- ویژگی‌های P
- پیوسته
- $x \in \mathbb{R}^n / \Omega$ به ازای تمامی $P > 0$
- $x \in \Omega$ اگر و فقط اگر $P = 0$

جریمه بیشتر با تعدد بیشتر از قید
تحکیم بیشتر قیدها در هر مرحله جهت

- ماندن در منطقه شدنی
- همزمان میل به کمینه


روش جریمه

مثال - تابع هدف با تعدادی قید نامساوی

$$\Omega = \{x: h_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$$

$$P(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\max[0, h_i(x)])^2$$

نمایش $\mu P(x)$ برای $h_1(x) = x - b, h_2(x) = a - x$



- μ بزرگ
- نقطه کمینه در زمانی که P کوچک
- ایده‌آل $\mu \rightarrow \infty$
- همگرا شدن نقطه پاسخ روش جریمه به مسئله مقید

روش جریمه‌ای

$$Q(x; \mu) = f(x) + \mu P(x)$$
$$\min Q(x; \mu)$$

روش
 μ پارامتر جریمه

دنباله‌ای از اعمال حل بهینه‌سازی نامقید بر $Q(x; \mu)$ روی دنباله‌ای از μ_k با $k \rightarrow \infty$

- $\mu_{k+1} > \mu_k$
- $\mu_k \rightarrow \infty$

منجر به افزایش اهمیت نسبی مقدار جریمه در هر تکرار
میل پاسخ به سمت صورت نامقید

تابع جریمه

$$\begin{aligned} & \min f(x) \\ & h_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

به صورت

$$h_i^+(x) = \max[0, h_i(x)] \quad i = 1, \dots, m$$

دلیل

- اساسا $P(x=0)$
- مقدار غیر صفر در صورت تخطی از محدودیت ها

تابع جریمه

ساده‌ترین

▪ افزودن تابع جریمه درجه دو

افزودن مربع تخطی از قید به تابع هدف

$$Q(\mathbf{x}; \mu) = f(\mathbf{x}) + \frac{\mu}{2} \sum_i (h_i^+(\mathbf{x}))^2 = f(\mathbf{x}) + \frac{\mu}{2} \|h^+(\mathbf{x})\|^2$$

μ پارامتر جریمه

روش جریمه‌ای

تبديل تابع مقيد

$$\begin{aligned} & \min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x}) \\ & , g_i(\boldsymbol{x}) = 0 \\ & , h_i(\boldsymbol{x}) \geq 0 \end{aligned}$$

به

$$Q(\boldsymbol{x}; \mu) = f(\boldsymbol{x}) + \frac{\mu}{2} \sum_i (g_i(\boldsymbol{x}))^2 + \frac{\mu}{2} \sum_i (\max(\{0, h_i(\boldsymbol{x})\}))^2$$

μ پارامتر جریمه

الگوريتم

μ_k دنباله‌ای از ضرائب از ۱، ۲، ...

- در هر مرحله $0 > \mu_{k+1} > \mu_k$ و μ_k

- میل ضریب به بینهایت

$$Q(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \frac{\mu}{2} \sum_i (g_i(\mathbf{x}))^2$$

برای هر k

- حل $\min Q(\mathbf{x}; \mu_k)$

ادامه تا یافتن پاسخ

$$\min x$$

$$x \geq 5$$

$$Q(x; \mu) = x + \frac{\mu}{2} \max(0, 5 - x)^2 \Rightarrow \nabla Q = 1 + \mu(5 - x) = 0 \Rightarrow x = 5 - \frac{1}{\mu}$$

مثال

$$\min \frac{1}{3}(x+1)^3 + y,$$

با توجه

$$1-x \leq 0$$

$$-y \leq 0$$

$$Q(x, y; \mu) = \frac{1}{3}(x+1)^3 + y + \mu[(\max 0, 1-x)^2 + (\max 0, -y)^2]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = (x+1)^2 - 2\mu \max(0, 1-x) = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial y} = 1 - 2\mu \max(0, -y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \min[(x+1)^2, (x+1)^2 - 2\mu(1-x)] = 0 \\ \min[1, 1 + 2\mu y] = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -1 & \text{عوقق} \\ x = -1 - \mu + \sqrt{\mu^2 + 4\mu} & \\ y = -\frac{1}{2\mu} & \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 & \text{عوقق} \\ x = -1 - \mu + \sqrt{\mu^2(1 + \frac{4}{\mu})} & \\ y = -\frac{1}{2\mu} & \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \left(-1 - \mu + \sqrt{\mu^2(1 + \frac{4}{\mu})} \right) = 1 & \\ y = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2\mu} \right) = 0 & \end{cases}$$

مثال

$$\min 2x^2 + 2xy + y^2 - 2y,$$

با توجه

$$x = 0$$

$$Q(x, y; \mu) = 2x^2 + 2xy + y^2 - 2y + \frac{\mu}{2}x^2 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial x} = 4x + 2y + \mu x = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial y} = 2x + 2y - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = 1 - x$$

$$4x + 2y + \mu x = 0 \Rightarrow 4x + 2 - 2x + \mu x = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{2+\mu}$$

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x = 0, y = 1$$

الگوريتم

تابع روش-جريمه(f و P و x و بيش k و $\mu = 1$ و $\gamma = 2$)

▪ برای k از ۱ تا بيش

$x = \text{كمينهساز}(f(x) + \mu P(x))$

$\mu *= \gamma$

$P(x) == 0$ اگر

▪ خروجي x

▪ انتها

▪ خروجي x

▪ انتها

روش جریمه‌ای

انتخاب مناسب پارامتر جریمه منجر به کاهش تعدادهای تکرار
امکان انتخاب مناسب پارامتر

محدودیت‌های روش جریمه‌ای

محدودیت‌ها در عمل

مشکل‌تر شدن کم کردن $Q(\mathbf{x}; \mu)$ با بزرگتر شدن μ_k

- بدوضعیت شدن تابع هسی $\nabla_{\mathbf{x}\mathbf{x}}^2 Q(\mathbf{x}; \mu)$ در نزدیکی کمینه‌ساز
- تاثیر بر روش محاسبات شبه-نیوتن
- کاهش صحت مراحل حساب شده با روش نیوتن
- تاثیر بر محاسبات ممیز شناور (حل پذیر)

تقریب تیلور مناسب حول همسایه کوچکی از $(\mathbf{x}; \mu)$

- منجر به قدم‌های کوچک
- همگرایی کند

روش مانعی

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ x \in \Omega \end{aligned}$$

Ω دارای درونی که امکان رسیدن به هر نقطه مرزی با حرکت از نقطه درونی


$$\Omega = \{x: h_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$$

- مجموعه مقاوم

- معمولا حاصل قیدهای نامساوی

- همچنین معروف به روش‌های درونی

- جلوگیری از خروج از منطقه



غیر مقاوم مانع مقاوم

روش مانعی

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ x \in \Omega \end{aligned}$$

$$\Omega = \{x: h_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$$

تابع مانع B

▪ تعریف شده درون Ω

▪ ویژگی‌ها

▪ پیوسته

▪ $B(x) \geq 0$

▪ $B(x) \rightarrow \infty$ با نزدیک شدن x به مرزها

نمونهٔ تابع مانع

با داشتن مجموعه مقاوم

$$\Omega = \{x: h_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$$

با فرض درون مجموعه x ‌هایی که

$$h_i(x) < 0$$

نمونهٔ تابع مانع


با داشتن مجموعه مقاوم

$$\Omega = \{x: h_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$$

با فرض درون مجموعه x ‌هایی که

$$h_i(x) < 0$$
$$B(x) = -\sum_{i=1}^m \frac{1}{h_i(x)}$$
$$h_1(x) = x - b, h_2(x) = a - x$$

نمایش $B(x)$ برای



نمونه تابع مانع ۲

$$B(x) = - \sum_{i=1}^m \ln(h_i(x)) \quad \text{تابع لگاریتم}$$

مورد استفاده در برنامه‌ریزی خطی نقطه درونی

تبدیل به تابع مانع

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ x \in \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min f(x) + \frac{1}{c} B(x) \\ \text{درون } \Omega \end{aligned}$$

▪ c ثابتی مشتب

▪ با پیشبرد تکرارها اجازه نزدیک شدن به مرزها

$$\begin{aligned} \min f(x) + \mu B(x) \\ \text{درون } \Omega \end{aligned}$$

▪ یا

▪ $\mu \rightarrow 0$ برابر با $c \rightarrow \infty$

▪ امکان استفاده از روش‌های معمول بهینه‌سازی نامقید

▪ جستجو در درون فضای شدنی

الگوريتم

تابع روش-نقطه-دروني (f و h و x و μ و k و γ و بيش)

▪ برای k از ۱ تا بيش

$$B(x) = -\sum_{i=1}^m \ln(h_i(x))$$

$$x = \text{كمينه‌ساز}\left(f(x) + \frac{1}{\mu} B(x)\right)$$

$$\mu *= \gamma$$

▪ انتها

▪ خروجي x

انتها

منابع

[لوئن برگر]

“Constrained Optimization: Sequential Quadratic Programming, Interior Point And Generalized Reduced Gradient Methods,”

B. W. Bader, “Constrained and unconstrained optimization,” 2009